

Cascade[®]

INSECTICIDA

Sus praderas más limpias.



Prevenga y controle temprano el daño de cuncunilla negra.

 **BASF**

The Chemical Company

Control eficaz de Cuncunilla negra

La época óptima de control es cuando las larvas se encuentran en los primeros estados de desarrollo, alrededor de 0,5 a 1,0 cm de largo. Normalmente esta etapa ocurre entre mediados de abril a junio (ver cuadro).

Beneficios:

- **CASCADE**, eficaz insecticida para el control de cuncunilla negra.
- **CASCADE**, es resistente al lavado por lluvias, debido a su baja solubilidad. Su eficiencia no es afectada si llueve 4 a 6 horas después de la aplicación, proporcionando un prolongado efecto residual.
- **CASCADE**, es compatible con herbicidas para control de malezas en pradera como ARRAT y MCPA.
- **CASCADE**, es estable a la luz y bajas temperaturas.

Se recomienda:

- Aplicar la dosis mayor con cuncunillas de 2 ó más cm de largo (junio a mediados de julio) o con alta presión de la plaga.
- Controles tempranos de la plaga, antes de que haya algún nivel de daño en la pradera.
- Pulverizar sobre pradera talajeada o después de un corte, así **CASCADE**, llega a la base de la planta, lugar donde se alimenta la cuncunilla negra.
- Aplicar **CASCADE** vía terrestre con 150 a 200 L de agua/ha.
- Los animales pueden reingresar al área tratada una vez que el insecticida se haya secado sobre el follaje.

La dosis recomendada es de 100/125 cc/ha.

Control temprano y efectivo con Cascade

