

Folpan® 50 WP

Fungicida multisitio

Folpan 50 WP, fungicida de contacto de la familia de las ftalamidas; está formulado como Polvo Mojable que contiene 500 g/Kg de folpet como ingrediente activo. Cumple una función importante dentro del manejo de vid como controlador de botritis (*Botrytis cinerea*) y otras enfermedades. Además, está recomendado para el control de enfermedades en frutales, hortalizas, cultivos anuales y viveros forestales.

Recomendaciones de Uso

Folpan 50 WP es un poderoso fungicida de contacto para control preventivo.

FRUTALES Y CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS	
		g/100 L agua	Kg/ha
Parronales, Viñedos	Botritis, oídio, antracnosis	200 - 300	3 - 4
	Mildiú	400 - 500	4 - 5
Frutales de carozo	Monilia, cloca	180 - 220	3 - 4
Manzanos, perales	Venturia, corazón mohoso (alternariosis)	180 - 220	3 - 4
Frutillas	Botritis	200 - 300	3 - 4
Frejoles	Antracnosis	200 - 260	2,5 - 3,5
Hortalizas	Caída de almácigos	25 - 30 g/m ²	—
Tomates, papas	Tizón temprano, tizón tardío, oídio o peste ceniza, botritis	200 - 300	2,0 - 3,5
Ajos, cebollas	Mildiú	200 - 260	3 - 4
Cucurbitáceas	Mildiú, botritis, alternaria	200 - 300	2,5 - 3,5
Vivero forestal	Botritis	200 - 300	3 - 4

Nota: En vides, no aplicar **Folpan** vía líquida después de la cuaja. En manzanos y perales, no aplicar desde floración hasta 30 días después de caída de pétalos para evitar riesgos de russet. No aplicar en mezcla o cerca (aproximadamente 7 días) de una aplicación de aceite.

Folpet puede retrasar la fermentación de los mostos, lo que se evita con una carencia de 40 días entre la última aplicación y la cosecha o agregando levaduras al momento de la fermentación.

- ▶ Excelente control de botritis en uva de mesa y vinífera
- ▶ Importante herramienta para manejo de resistencia
- ▶ Amplio espectro de acción
- ▶ Muy activo por su alta liposolubilidad
- ▶ Amplios registros
- ▶ No afecta abejas ni insectos benéficos
- ▶ No deja residuos en los vinos después de la fermentación

Cultivando **Innovación**
Creando **Valor**

 **BASF**

The Chemical Company

Importante Herramienta en el Manejo de Resistencia

Folpan 50 WP es una importante herramienta en el manejo de resistencia, debido a su amplio espectro de acción y a su acción "multisitio" en el metabolismo de los patógenos. Por estas características **Folpan 50 WP** tiene una muy baja probabilidad de provocar la selección de razas resistentes de los hongos.


Resultado de Ensayo en Vid

En el siguiente ensayo se demuestra la eficacia biológica de **Folpan 50 WP** en el control de botritis en vides.

Tratamiento: Se realizaron 4 aplicaciones en floración, cierre, pinta y pre-cosecha. Tanto **Folpan** como **Captan** se aplicaron en dosis de 250 g/100 L con volúmenes de 1500 a 2000 L/ha de agua.

Control de botritis en vides cv. Riesling con Folpan 50 WP y Captan 83 WP a iguales dosis de producto comercial.

Ing. Agr. PhD. Mario Alvarez e Ing. Agr. M. Sc. Blacaluz Pinilla. Convenio INIA-BASF, Casablanca, 1999/2000.



Conclusión: En este ensayo se observa que en evaluaciones a cosecha para el control de botritis, tanto **Folpan** como **Captan** mostraron igual eficacia cuando fueron aplicados a igual dosis de producto comercial.

Amplios Registros

	Tolerancias (ppm)							
	USA	Can	Méx	UE	Bra	Cor	Jap	Códex
Vid	25	25	25	3	15	5	2	2
Duraznos	---	0.1	---	2	2	---	---	---
Nectarines	---	0.1	---	2	2	---	---	---
Peras	---	0.1	---	3	---	---	--	---
Manzanas	25	25	25	3	10	---	---	---

Información obtenida a Agosto de 2004 en ASOEXPORT.

Compatibilidad

Folpan 50 WP es compatible con otros fungicidas, especialmente en el control de botritis, donde tiene excelente comportamiento en mezcla con benomilo, iprodione y otros botriticidas. Puede ser utilizado en polvo, en mezcla con azufre, para espolvoreo en vides. No es compatible con productos alcalinos, aceites o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones de aceite.

No mezclar con formulaciones de fitosanitarios Concentrado Emulsionable (EC).

Toxicidad

Folpan 50 WP está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como "producto que normalmente no ofrece peligro", categoría IV, franja de color verde.

LD50 oral > 5000 mg/Kg

LD50 dermal > 2000 mg/Kg

Más información en:

www.basf.cl/agro

® Folpan es marca registrada Makhteshim. Leer la etiqueta antes de usar el producto.

BASF Chile S.A. Santiago: Carrascal 3851. Fono: 6407000. **La Serena:** Fono: 231544. **La Calera:** Fono: 226581. **San Felipe:** Fono: 510947. **Rancagua:** Av. Einstein 287. Of 207. Fono: 219357. **Curicó:** Fono: 09 - 3285458. **Chillán:** Fono: 270607. **Temuco:** Panamericana Sur 4750. Fono: 337981. **Osorno:** Fono: 236103.

"Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha de este documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a las personas que reciben las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ninguna reclamación o exigencia de garantía, ya sea explícita o implícita, de cualquier naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendaciones o al producto al cual estas últimas se refieren".

